



COVID-19: Smitteopsporing af nære kontakter



COVID-19: Smitteopsporing af nære kontakter

© Sundhedsstyrelsen, 2020.
Publikationen kan frit refereres
med tydelig kildeangivelse.

Sundhedsstyrelsen
Islands Brygge 67
2300 København S

www.sst.dk

Elektronisk ISBN: 978-87-7014-174-1

Sprog: Dansk

Version: 2

Versionsdato: 16.06.2020

Format: pdf

Udgivet af Sundhedsstyrelsen,
Juni 2020

Indholdsfortegnelse

1. Baggrund	4
1.1. Øvrige retningslinjer for forebyggelse af udbrud, smitteopsporing og indikationer for test.....	5
2. Hvem er en nær kontakt?	7
2.1. Periode for smitteopsporing.....	8
3. Organisering af smitteopsporing og håndtering af nære kontakter.....	9
3.1. Rammerne for kontaktopsporing ved positivt testresultat	9
3.2. Henvi sning til test af nære kontakter for ny coronavirus	10
3.3. Test af nære kontakter.....	11
4. Information om kontaktopsporing.....	14
4.1. Information til patienter, som er testet positiv for ny coronavirus	14
4.2. Information til nære kontakter	14
5. Justering af program på baggrund af erfaringer.....	16
5.1. Opfølgning på program.....	16
Bilag 1	17

1. Baggrund

En forudsætning for den gradvise kontrollerede genåbning af samfundet i Danmark er et samtidigt og stort fokus på at mindske smitte i befolkningen. Det er afgørende for at undgå en uhensigtsmæssig hastig spredning af ny coronavirus.

Det er vigtigt at sætte ind, der hvor der er en øget eller særlig risiko for smittespredning. Indsatsen skal være effektiv og bæredygtig. I en langvarig og bæredygtig åbning af samfundet er det afgørende, at de programmer, der iværksættes, på den ene side effektivt mindsker smittespredningen, og på den anden side muliggør borgernes hverdagsliv og opretholdelse af vores velfærdssamfund – ellers bliver de ikke bæredygtige.

Genåbningen af samfundet understøttes sundhedsfagligt forsvarligt ved effektiv isolation af patienter, der er testet positiv for ny coronavirus, samt ved sideløbende opsporing og test af dem, der har været en nær kontakt til personer med en positiv test for ny coronavirus. Et program til opsporing af nære kontakter kan ikke sikre, at alle nære kontakter bliver fundet og testet, men må forventes at være af væsentlig betydning for smittereduktionen. Ambitionen er at reducere smitten med ny coronavirus i samfundet og derigennem bidrage til effektiv kontrol af epidemien.

Hvis man har været i tæt kontakt med en person med COVID-19 ved vi, at der kan være øget risiko for at være blevet smittet. Det er situationen, hvor en af dem man bor sammen med, viser sig at have COVID-19, eller en kollega på arbejdspladsen, som man har stået tæt på i mere end 15 min osv. I sådanne situationer har man en særlig risiko for at være blevet smittet med ny coronavirus, og det er derfor væsentligt at iværksætte et program, der kan identificere, om man som nær kontakt er blevet smittet, og på den måde hjælpe til korrekt og effektiv selvisolation.

Programmet er baseret på følgende principper:

- Indsatsen skal bidrage til bedst mulig smitteinddæmning
- Indsatsen skal kunne formidles og kommunikeres meningsfuldt til borgeren
- Antallet af test skal være rimeligt i forhold til borgerens tidsforbrug, herunder rimelig transporttid mv.
- Der skal etableres et landsdækkende lettilgængeligt tilbud for at få størst mulig tilslutning

Programmet er baseret på den aktuelle viden om ny coronavirus, herunder viden om, hvornår det forventes, at smittespredning foregår. Tilrettelæggelsen af antallet af test på specifikke dage i kombination med selvisolation er således baseret på den eksisterende

evidens om inkubationstid, præsymptomatisk og asymptomatisk smitte mv. Der er desuden blevet foretaget en matematisk modellering, som Sundhedsstyrelsen har ladet sig inspirere af i tilrettelæggelsen.

Sundhedsstyrelsen er blevet rådgivet undervejs vedr. smitteopsporing af nære kontakter af en ekspertgruppe med deltagelse af specialister i infektionsmedicin, almen medicin, intensiv terapi, pædiatri, klinisk mikrobiologi, samfundsmedicin og infektions epidemiologi, samt sygehusledelse.

Formålet med denne publikation er at beskrive rammerne for programmet for smitteopsporing af nære kontakter til personer, som er testet positivt for ny coronavirus, herunder en beskrivelse af de organisatoriske rammer for smitteopsporing samt en beskrivelse af informationsindsatsen ifbm. smitteopsporingen.

For information om selvisolation og behov for støtte til dette henvises til Sundhedsstyrelsens vejledning herom (forventes offentliggjort i uge 25).

Denne publikation er første gang udgivet d. 14. maj 2020 og er nu opdateret på baggrund af etableringen af enheden for kontaktopsporing i Styrelsen for Patientsikkerhed ved navn *Coronaopsporing*.

1.1. Øvrige retningslinjer for forebyggelse af udbrud, smitteopsporing og indikationer for test

Sundhedsstyrelsen har løbende beskrevet og opdateret retningslinjer for test for ny coronavirus i [Sundhedsstyrelsens retningslinjer for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet](#). Heraf fremgår det, at hvis en person har haft nær kontakt til en patient med COVID-19, bør denne person testes. For øvrige indikationer for test henvises til førnævnte retningslinje for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet.

Der er iværksat en række forskellige tiltag for at undgå smittespredning, programmet for test af nære kontakter står således ikke alene. Der er en særlig opmærksomhed på at forebygge udbrud på institutioner som fx plejecentre og sygehuse.

Forebyggelse af udbrud ved konstateret smitte med ny coronavirus på plejecentre, botilbud eller lignende institutioner

Håndtering af tilfælde af COVID-19 på plejecentre, botilbud og lignende institutioner er beskrevet i [Sundhedsstyrelsens vejledning om forebyggelse af smitte med COVID-19 på plejecentre, bosteder og andre institutioner](#). Det fremgår af denne, at hvis der påvises ny coronavirus hos en beboer eller medarbejder, bør der for at forebygge udbrud udføres test af alle beboere og tilknyttede medarbejdere på institutionen (eller efter omstændighe-

derne det pågældende afsnit). Test bør udføres hver 7. dag indtil der ikke længere konstateres nye tilfælde. Testforløbet indebærer ikke i sig selv krav om selvisolation for personalet, mens testresultatet afventes.

I de særlige tilfælde, hvor en medarbejder eller anden borger på institutionen defineres som nær kontakt, bør personen håndteres efter testprogram og anbefalinger for nære kontakter, som beskrevet i nærværende retningslinje. Styrelsens for Patientsikkerhed understøtter kontaktopsporing af nære kontakter uden for institutionen, jf. afsnit 3.1 om rammerne for kontaktopsporing.

Forebyggelse og håndtering af udbrud med ny coronavirus på sygehuse

For nærmere information om håndtering af tilfælde med COVID-19 på sygehuse henvises til [Sundhedsstyrelsens retningslinjer for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet](#).

I de tilfælde, hvor sygehuspersonalet har været nær kontakt til en patient med COVID-19 uden anvendelse af foreskrevne værnemidler håndteres personen efter testprogram og anbefalinger for nære kontakter jf. nærværende retningslinje.

Der er derudover fokus på at undgå smittespredning på steder hvor mange er samlet, såsom fx skoler og dagtilbud.

Forebyggelse af udbrud ved konstateret smitte med ny coronavirus i skoler, dagtilbud og andre tilbud til børn og unge

Håndtering af tilfælde af COVID-19 i skoler, dagtilbud mv. er beskrevet i Sundhedsstyrelsens [information om forholdsregler ved tilfælde af COVID-19 i skoler, dagtilbud og andre tilbud til børn og unge](#). Du kan læse mere om håndtering af både enkelte eller flere tilfælde af COVID-19 i dette informationsmateriale.

I de tilfælde, hvor en medarbejder eller et andet barn/ung på skolen eller i dagtilbuddet har været nær kontakt, bør personen håndteres efter testprogram og anbefalinger for nære kontakter, som beskrevet i nærværende retningslinje. Det anbefales i den forbindelse, at ledelsen er behjælpelig med opsporingsarbejdet og kan søge rådgivning hos den kommunale sundhedstjeneste.

2. Hvem er en nær kontakt?

- En person, der bor sammen med en, der har fået påvist ny coronavirus
- En person, der har haft direkte fysisk kontakt (fx kram) med en, der har fået påvist ny coronavirus
- En person med ubeskyttet og direkte kontakt til smittefarlige sekreter fra en person, der har fået påvist ny coronavirus
- En person der har haft tæt "ansigt-til-ansigt" kontakt inden for 1 meter i mere end 15 minutter (fx i samtale med personen) med en, der har fået påvist ny coronavirus.
- Sundhedspersonale og andre, som har deltaget i plejen af en patient med COVID-19 og som ikke har benyttet værnemidler på de foreskrevne måder.

Nære kontakter vil typisk være personer, der bor sammen med en med påvist ny coronavirus. Derudover kan det være enkelte tætte kolleger på arbejdspladsen og evt. venner og familie, som den med påvist ny coronavirus, har været tæt sammen med.

Hvis man har fulgt Sundhedsstyrelsens generelle råd om fysisk afstand, hostetikette og hygiejne, vil det være meget få personer, som man har været nær kontakt med.

Nære kontakter vil være dem, man bor sammen med, og dagligt deler soveværelse, sofa, kram osv. med. Det vil være de få kolleger og venner, hvor man ikke har haft mulighed for at overholde rådene om at holde afstand. Det kan fx være en situation, hvor man har været nød til at stå meget tæt på en kollega i længere tid. Det kan også være en situation, hvor man har rykket sig lidt for tæt sammen om et middagsbord med venner. Det kan også være i situationen, hvor man har håndteret en borger, der senere viser sig at have COVID-19, og ikke har anvendt de foreskrevne værnemidler.

De kolleger, man arbejder sammen med på en afdeling på et sygehus, på et plejehjem, eller på et kontor, og som man ikke har været meget tæt på (under 1 meter) i en sammenhængende periode på mere end 15 minutter, er ikke en nær kontakt.

Det er ikke forventningen, at der ved manuel kontaktopsporing at personer, der for den med påvist ny coronavirus ikke er kendt, kan identificeres og kontaktes. Det er forventningen, at de i et vist omfang spores med digital kontaktopsporing, som supplerer manuel kontaktopsporing, jf. nedenfor.

2.1. Periode for smitteopsporing

Kontakten mellem patienten med påvist ny coronavirus og den nære kontakt skal have fundet sted i den periode, hvor der antages at være størst mulighed for smittespredning, som defineret i nedenstående boks.

Smitteperioden for patienter med symptomer afgrænses til:

- Fra 48 timer før symptomdebut til 48 timer efter symptomophør

Smitteperioden for patienter med positivt testresultat, men uden symptomer, afgrænses til:

- 48 timer før patienten fik foretaget testen til 7 dage efter

3. Organisering af smitteopsporing og håndtering af nære kontakter

For at mindske smitte med ny coronavirus skal der foretages smitteopsporing, når en patient testes positiv for ny coronavirus. Smitteopsporingen omfatter 3 dele:

- 1) Identifikation af nære kontakter. Dette omfatter en gennemgang af hvilke kontakter, der opfylder definitionen om at være en nær kontakt til en person med påvist ny coronavirus – inden for smitteperioden
- 2) Kontakt til de nære kontakter, som informeres om, at de er en nær kontakt til en med påvist ny coronavirus
- 3) Test og selvisolation af nære kontakter med henblik på at mindske smittespredning

I følgende afsnit beskrives de organisatoriske rammer for de to første dele af smitteopsporingen, også kaldet kontaktopsporing. Efterfølgende beskrives de organisatoriske rammer for test af nære kontakter, herunder rammerne for henvisning til test. For information om selvisolation henvises til Sundhedsstyrelsens vejledning herom (forventes offentliggjort i uge 25).

Til sidst i dokumentet er beskrevet den information, borgerne skal have i forbindelse med smitteopsporingen. Sundhedsstyrelsen har i tillæg til dette udarbejdet handlingsanvisende informationsmateriale til både patienten, der er testet positiv og dennes pårørende samt til de nære kontakter.

3.1. Rammerne for kontaktopsporing ved positivt testresultat

Patienter har adgang til deres testresultat via sundhed.dk. Patienten får desuden adgang til Sundhedsstyrelsens informationsmateriale om, hvordan de skal forholde sig ved positivt testresultat. Patienten opfordres i informationsmaterialet til selv at iværksætte isolation og kontaktopsporing, så dette kan påbegyndes så tidligt som muligt.

Der er fra uge 24 2020 oprettet en kontaktopsporingsenhed under Styrelsen for Patient-sikkerhed ved navn *Coronaopsporing*. Sundhedsfaglige medarbejder fra *Coronaopsporing* vil kontakte alle personer, som er testet positiv for ny coronavirus, for at tilbyde støtte med kontaktopsporing af nære kontakter. I den forbindelse oplyses patienten også om de forholdsregler, som et positivt testresultat afstedkommer, herunder anbefalinger om isolation mv.

Yderligere skal der gøres opmærksom på Sundhedsstyrelsens informationsmateriale. Se mere om information til patienten s. 15. Ved behov for lægefaglig rådgivning omkring sygdomsforløbet mv., kan patienten ringe til egen læge.

Coronaopsporing tilbyder personer, der er testet positiv for ny coronavirus, hjælp og støtte til at identificere deres nære kontakter og videregive information til dem, således at der sikres en systematisk opsporing. Nogle patienter kan med den information, de har modtaget, selv foretage kontaktopsporingen og informere deres nære kontakter. Det gælder særligt, hvis der alene er tale om husstanden. Andre patienter vil have behov for hjælp til dette. *Coronaopsporing* kan i så fald hjælpe med at identificere, kontakte og informere personens nære kontakter.

Hvis man er testet positiv for ny coronavirus, så bliver man som udgangspunkt kontaktet af en medarbejder fra *Coronaopsporing* inden for 24 timer efter testsvar. Patienten kan også selv kontakte *Coronaopsporing* på tlf. 32 32 05 11.

Læs mere om kontakt til patienter med påvist ny coronavirus samt støtte til kontaktopsporing af nære kontakter på [Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside](#).

Den ovenfor beskrevne manuelle kontaktopsporing suppleres i midten af juni af en digital smittesporingsapp, som borgerne kan vælge at benytte. Denne er dog et tillæg til den manuelle kontaktopsporing, som fortsat skal foretages. Gennem appen bliver det muligt for patienter at advisere personer, som de har været i tæt på i fx offentlig transport, men som de ikke kender, og derfor ikke kan kontaktes gennem den manuelle kontaktopsporing.

3.2. Henvisning til test af nære kontakter for ny coronavirus

Nære kontakter opfordres til at blive testet to gange og at selvisolere indtil første negative testresultat. Information om interval for test er beskrevet i nedenstående afsnit om test af nære kontakter.

Henvisning til test for ny coronavirus kan ske ved at ringe til *Coronaopsporing* på tlf. 32 32 05 11. Den praktiserende læge kan også henvise til test, hvis den nære kontakt henvender sig der. Nære kontakter uden symptomer på COVID-19 henvises til test i Test-Center Danmark ved at oprette en rekvisition i WebReq. Den nære kontakt skal testes to gange, jf. nedenstående afsnit om test af nære kontakter, og der skal derfor oprettes to på hinanden følgende rekvisitioner via WebReq med en særlig markering for nære kontakter, der sikrer prioriteret adgang til test. For vejledning til rekvisition af test til nære kontakter se MedComs [hjemmeside](#).

Ved henvisning til test oplyses den nære kontakt om, at personen selv skal booke tid til test via coronaprover.dk. For borgere, der ikke kan booke tid digitalt, er der i hver region etableret telefonisk hjælp med booking.

Hvis den nære kontakt selv har symptomer på COVID-19 henvises efter vanlig praksis til regional COVID-19 klinik enten direkte til test eller klinisk vurdering, jf. [Sundhedsstyrelsens retningslinje for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet](#).

Børn under 12 år kan have svært ved at medvirke til test. Hvis der er et ønske om, at et barn, som har været nær kontakt til en person med påvist ny coronavirus, ikke bliver testet, kan man undlade at gøre dette. I stedet anbefales asymptotiske børn, der er nære kontakter at blive hjemme i isolation indtil 7 dage efter sidste eksponering. Såfremt de i denne periode ikke udvikler symptomer på COVID-19, kan de igen komme i institution eller i skole. Det er i den forbindelse en forudsætning, at personen efter positivt testresultat med ny coronavirus kan opretholde selvisolering i forhold til barnet, så barnet ikke løbende bliver udsat for mulig smitte fra eksempelvis en forælder med påvist ny coronavirus. Aldersgrænsen i ovenstående er vejledende, og på baggrund af et konkret fagligt skøn kan man vurdere behovet for test ved det enkelte barn.

Sygehusmedarbejdere, som har været nær kontakt til en person med positiv test for ny coronavirus henvises via personaleleder direkte til test i regional COVID-19 klinik, men håndteres i øvrigt efter nærværende retningslinje for smitteopsporing af COVID-19 hos nære kontakter.

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en [vejledning til almen praksis](#) om henvisning til test for ny coronavirus, herunder henvisning af nære kontakter og den information de nære kontakter skal have ifbm. henvisningen.

3.3. Test af nære kontakter

Efter henvisning til test i TestCenter Danmark skal den nære kontakt testes to gange i et TestCenter Danmark testcenter¹, eller et decentralt tilbud fra TestCenter Danmark eksempelvis i form af mindre decentrale klinikker, udkørende funktion eller mobile enheder. Let adgang til podning understøtter en høj tilslutning til programmet.

Den nære kontakt booker selv tid og sted til test via coronaprover.dk. Det er beskrevet i boksen nedenfor, hvilke dage den nære kontakt skal testes. *Coronaopsporing* kan støtte og vejlede, såfremt den nære kontakt er i tvivl om, hvilke dage personen skal booke test. Hver region yder også telefonisk bistand, hvis personen ikke selv er i stand til at booke tid til test digitalt.

¹ Der findes aktuelt testcentre i følgende kommuner: Hillerød, Ballerup, Hvidovre, København, Bornholm, Roskilde, Næstved, Odense, Esbjerg, Kolding, Viborg, Herning, Aarhus, Aalborg, Thisted og Hjørring

Interval for test

- 1. test foretages samme dag eller snarest muligt efter, at personen er blevet identificeret som nær kontakt. Der skal dog mindst være gået 4 dage fra man blev udsat for mulig smitte (dag 0)
- 2. test foretages to dage efter 1. test uanset om der er kommet svar på første test
 - Ved 1. test på dag 4 foretages ny test dag 6, som udføres uanset om der er kommet svar på første test fra dag 4
 - Ved 1. test på dag 5 foretages ny test dag 7, som udføres uanset om der er kommet svar på første test fra dag 5
 - Ved 1. test på 6. dag og frem foretages ikke yderligere test

I de tilfælde hvor der har været løbende eksponering og eksponeringstidspunktet derfor ikke kan fastsættes foretages 1. test hurtigst muligt og anden test 2 dage senere.

Hvis der er gået mere end 14 dage siden sidste mulige smitteeksponering henvises den pågældende ikke til test, men opfordres til at tage kontakt til egen læge ved udvikling af symptomer.

Hvis der opnås et positivt testresultat, skal patienten ikke møde op til efterfølgende test.

Patienten tilrådes fortsat selvisolation indtil 2 døgn efter symptomophør, hvis der opstår symptomer. Hvis der ikke opstår symptomer i perioden, skal personen selvisolere indtil 7 dage efter testen blev foretaget. Der skal iværksættes kontaktopsporing af nære kontakter. Læs mere i information til patienter på s. 13.

Hvis en nær kontakt allerede tidligere er testet positiv for ny coronavirus anbefales kun, at den nære kontakt testes og iværksætter selvisolation, hvis det er mere end 8 uger siden den positive test blev foretaget.

3.3.1. Podning i TestCenter Danmark telt eller i en decentral funktion fra TestCenter Danmark

Den nære kontakt kan efter henvisning booke tid og sted til podning, og møder op på det pågældende tidspunkt.

Prøverne indsamles og registreres af TestCenter Danmark og, testen analyseres på Statens Serum Institut.

3.3.2. Podning i de regionale COVID-19 klinikker af sygehusmedarbejder

Podning af personale i sygehusvæsenet, som har været nære kontakter til en med påvist ny coronavirus foretages i de regionale udredningsklinikker, prøven analyseres af de regionale mikrobiologiske afdelinger.

4. Information om kontaktopsporing

4.1. Information til patienter, som er testet positiv for ny coronavirus

Patienter har adgang til deres testresultat via sundhed.dk. Patienten får desuden adgang til Sundhedsstyrelsens informationsmateriale om, hvordan de skal forholde sig ved positivt testresultat. Patienten opfordres i informationsmaterialet til selv at iværksætte isolation og kontaktopsporing, så dette kan påbegyndes så tidligt som muligt.

Styrelsen for Patientsikkerheds enhed *Coronaopsporing* ringer som udgangspunkt til alle personer, som er testet positiv for ny coronavirus, for at rådgive om forholdsregler ved et positivt testresultat og for at tilbyde støtte med kontaktopsporingen af nære kontakter. I den forbindelse skal det sikres, at patienten bliver informeret om:

- At det er vigtigt, at der hurtigst muligt tages kontakt til personer, som patienten har været i nær kontakt med (jf. definition af nære kontakter ovenfor), og at henvise de nære kontakter til [Sundhedsstyrelsens information](#) om, hvordan de skal forholde sig.
- At Styrelsen for Patientsikkerhed tilbyder rådgivning og hjælp i forbindelse med opsporing og videreformidling af information til nære kontakter. Iværksætte frivillig selvisolation
 - Hvis patienten har eller får symptomer på COVID-19 anbefales isolation indtil 48 timer efter symptomophør
 - Hvis patienten er asymptomatisk anbefales isolation i 7 dage efter testen blev foretaget.

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet [informationsmateriale til personer, som er testet positiv for ny coronavirus](#), hvori det beskrives nærmere, hvordan personen skal forholde sig til et positivt testresultat.

4.2. Information til nære kontakter

Nære kontakter bliver, jf. denne retningslinje, hurtigst muligt kontaktet af enten patienten, dennes pårørende eller en medarbejder fra Styrelsen for Patientsikkerhed, og informeres om følgende:

- At udvise skærpet opmærksomhed på symptomer, der kan være tegn på COVID-19 til og med 14 dage efter nær kontakt med personen med påvist ny coronavirus.

- At de, også selvom de ikke har symptomer på COVID-19, bør tage kontakt til *Coronaopsporing* på tlf. 32 32 05 11 eller til deres egen læge med henblik på at blive henvist til test for ny coronavirus. Herefter skal de selv booke tid til to test via coronaprover.dk, jf. ovenstående afsnit om test af nære kontakter.
- At de bør iværksætte frivillig selvisolation indtil der foreligger svar på første testresultat. Hvis testen er negativ kan de afslutte selvisolation og fx tage på arbejde, handle ind mv.
- At følge Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger om håndhygiejne, hosteetikette, fysisk afstand og at vise særligt hensyn til sårbare, som kan være i særlig risiko for alvorligt forløb ved smitte med ny coronavirus.
- At tage kontakt til Styrelsen for Patientsikkerheds enhed *Coronaopsporing* ved ønske om eller behov for yderligere rådgivning.

Patienten, dennes nærmeste pårørende eller medarbejder fra *Coronaopsporing* skal i forbindelse med ovenstående henvise den nære kontakt til [Sundhedsstyrelsens informationsmateriale til nære kontakter](#), hvori det beskrives nærmere, hvordan den nære kontakt skal forholde sig til ovenstående information.

Hvis personen får besked om at have været tæt på en person, der er testet positiv for ny coronavirus i den tidligere omtalte Smittestop-app til digital kontaktopsporing, så får personen adgang til den tilsvarende information via appen. Det vil i særlig grad være relevant for de personer, som ikke gennem den manuelle kontaktopsporing har kunne få besked, idet patienten ikke kender denne kontakt.

Kontaktoplysninger til *Coronaopsporing* under Styrelsen for Patientsikkerhed

Telefonnummer: 32 32 05 11

E-mail: kontaktopsporing@stps.dk

5. Justering af program på baggrund af erfaringer

5.1. Opfølgning på program

For meningsfuldt at kunne justere programmet på baggrund af erfaringerne med test af nære kontakter, er det vigtigt, at der foreligger information om de nære kontakter, som er blevet testet. Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en liste (bilag 1) over relevante indikatorer, som der løbende bør monitoreres mhp. justering af programmet, fx antallet af 1. prøver der er negative og som efterfølgende bliver positive, tilslutning til programmet mv.

Bilag 1

Forslag til indikatorer til brug for monitorering af smitteopsporing af nære kontakter mhp. løbende justering og tilpasning af programmet, herunder anbefalinger for test.

- Antal nære kontakter henvist til test
- Antal nære kontakter, der fik foretaget 1. test, samt fordeling af positivt/negativt testresultat
- Antal nære kontakter, der fik foretaget 2. test, samt fordeling af positivt/negativt testresultat
- Antal nære kontakter med 1. test negativ og 2. test positiv
- Antal dage mellem 1. og 2. test af nære kontakter
- Antal smittede, der tager kontakt til Styrelsen for Patientsikkerheds enhed *Coronaopsporing*
- Antal nære kontakter pr. smittet (gennemsnit)
- Antal nære kontakter, som Styrelsens for Patientsikkerhed har kontaktet, samt antallet af nære kontakter, som det ikke er lykkedes at få fat i

Sundhedsstyrelsen
Islands Brygge 67
2300 København S

www.sst.dk

Sundhed for alle ♥ + ●